

枝豆

トンネルから露地まで、食味は絶品！


(カネコ育成)

湯あがり娘

Green Soybean, Yuagarimusume

PVP

農林水産省品種登録第10875号



湯あがり娘枝豆の糖含量 (%)

品種	合計	ショ糖	果糖	ブドウ糖
湯あがり娘	4.19	2.30	0.77	1.12
他品種	2.03	1.58	0.22	0.23

くにさだ育種農場 2000年4月播種、6月下旬測定
(成分含有量は気候、収穫時期により変動します)

カネコ種苗株式会社

TEL. 027(251)1611(代)

トンネルから露地まで、夏の逸品、食味は絶品！

(カネコ育成) 湯あがり娘 エダマメ

Green Soybean, Yuagarimusume

●特 性●

- (1) 茶豆特有の芳香を持ち、食味の良さに特に影響するショ糖含量の多い、食味抜群の品種です。
- (2) エダマメ収穫時の子実は鮮緑色、完熟種子は黄色です。
- (3) 毛茸は白く、ゆであがった莢色は濃緑色で、市場性の高い品種です。
- (4) 3粒莢が多く、規格外品の少ない、秀品率の高い多収品種です。
- (5) 倒伏に強く、モギやすい、作業性に優れた品種です。
- (6) 85日タイプの中早生種で、特に中間地の3月下旬から4月下旬播種のトンネル～露地マルチ作型、冷涼地の5月中旬から6月中旬播種の露地マルチ～露地作型に適します。

●栽培要点●

(1) 播種

適期播種を心がけてください。むやみな早まきは過繁茂、着莢不良の原因となりますので厳禁です。発芽を揃えるために、育苗の場合は播種前に灌水を済ませ、適湿状態にしてから播種し、播種直後の灌水は控えてください。また、播種直後に種子が水に

浸かるような降雨が予想される場合の直播は避けてください。

(2) 施肥

トンネル作型での多窒素は過繁茂となりますので控えめにしてください。一方、露地栽培は地力のある圃場での栽培が適し、生育後半の肥切れ防止に緩効性肥料の使用が有効です。

(トンネル・露地マルチ作型例)

N : P : K = 0 ~ 6 : 0 ~ 20 : 0 ~ 20 (kg / 10a)

(露地作型例)

N : P : K = 8 ~ 10 : 25 ~ 30 : 25 ~ 30 (kg / 10a)

(3) 栽植様式

作型表を参照し、遅い播種期ほど株間を狭め、栽植本数を増やします。着莢性、莢品質向上のため、1本立ちが適します。

(4) 適期収穫

食味の良さが持ち味の品種ですので、収穫遅れのないように注意してください。特に、高温期からは収穫適期幅が3日程度と短くなるので、無理のない播種計画を立ててください。開花後、30～35日で収穫適期になります。若どりでは甘みが強く、遅どりでは香りが強くなる傾向があります。

●栽培作型●

	3	4	5	6	7	8	9	備考
温暖地 中間地	○ (直播は4/20以降)	◎ ×	○	◻ (90日)	◻ (87日)	◻ (77日)	◻ (75日)	(トンネル・露地マルチ作型) 9220～9225黒マルチ (露地作型) 70～80×20～25cm 5月中旬以降の播種は 結束出荷、家庭菜園向き
東北 冷涼地			○ (直播は5/20以降)	◎	○	◻ (85日)	◻ (80日)	(5月播種、露地マルチ作型) 9230～9235黒マルチ (6月播種、露地マルチ・露地作型) 9220～9225黒マルチ 70～80×20～30cm 6月中旬以降の播種は 結束出荷、家庭菜園向き
やませ地域				◎	○	◻ (85日)	◻ (80日)	(露地作型) 70～80×25～30cm

○・◎ 播種期 ◎・◎ 最適播種期 ◯ トンネル × 定植期 — 生育期 ◻ 収穫期

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12
TEL. 027(251)1611(代)

取扱店